

DIAGNOSI: Insufficiente ampiezza del palato con morso incrociato monolaterale (crossbite monolaterale)

Sintomi/Segni:

- Frequente presenza di asimmetria frontale del volto, anche in età molto precoce
- Labbra con possibilità di scarso suggello per respirazione mista od orale
- Arcata superiore di diametro ridotto rispetto a quello dell'arcata inferiore, come se si fosse in presenza di un coperchio insufficiente per la sua scatola
- A denti chiusi: linee mediane dentali non centrate, con dentatura superiore latero-posteriore rientrante solo monolateralmente rispetto alla relativa dentatura inferiore (cross monolaterale)
- Durante il movimento di chiusura: scivolamento laterale dell'arcata inferiore rispetto alla superiore dal lato del cross (laterodeviiazione funzionale)
- Più raramente: assenza di scivolamento per asimmetria vera delle emiarcate (crossbite monolaterale senza laterodeviiazione funzionale)



Attenzione:

- Questa malocclusione disfunzionale è molto frequente e va trattata, in coerenza con tutte le linee guida, il più precocemente possibile, anche in dentatura decidua, per evitare in primis che la laterodeviiazione funzionale si trasformi in laterognazia stabile.
- Molto spesso si associa alla presenza di problematiche respiratorie di natura ostruttiva e/o allergica. Il trattamento precoce può essere estremamente utile a ridurre le problematiche respiratorie ostruttive legate all'insufficienza scheletrica trasversale del mascellare superiore.

HAI UNA DOMANDA PER GLI SPECIALISTI A.S.I.O. ?
Compila il form su <http://www.asio-online.it/consulenza-ortodontista-pediatra.php>
GLI SPECIALISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE

Approfondisci le tematiche su www.agendadelsorriso.it

Cerca un ortodontista vicino a te su www.asio-online.it



Cosa fare:

Nel caso il Pediatra individui una malocclusione di questo tipo, è davvero importante e nell'interesse del piccolo paziente che lo stesso sia inviato dallo Specialista in Ortodonzia. Lo Specialista saprà completare la diagnosi e proporre le opportune terapie. Spesso sarà utile lavorare in multidisciplinarietà anche con il contributo dell'Otorinolaringoiatra per decidere il timing del da farsi.



A FINE FASE DI TRATTAMENTO ORTOPEDICO ORTODONTICO INTERCETTIVO

HAI UNA DOMANDA PER GLI SPECIALISTI A.S.I.O. ?
Compila il form su <http://www.asio-online.it/consulenza-ortodontista-pediatra.php>
GLI SPECIALISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE

Approfondisci le tematiche su www.agendadelsorriso.it

Cerca un ortodontista vicino a te su www.asio-online.it