

DIAGNOSI: PERDITA PREMATURA DEI DENTI DECIDUI



Sintomi/Segni:

- Perdita di un dente da latte prima del tempo fisiologico



Cause:

- Lesioni cariose destruenti, perdita per trauma, affollamento endo-osseo con carenza di spazio per la permuta dei denti permanenti (di solito dovuta ad un insufficiente sviluppo trasversale del palato)



PERDITA PRECOCE DI MOLARI
DECIDUI PER CARIE



PERDITA PRECOCE DI UN
CANINO DECIDUO



PERDITA PRECOCE DI UN
PRIMO MOLARE DECIDUO



Attenzione:

Ogni deciduo guida la permuta del dente permanente corrispondente. I secondi molari decidui guidano anche l'eruzione dei primi molari permanenti, che compaiono in sesta posizione subito al di là della fine della dentatura decidua. Le **lesioni cariose dei denti da latte vanno curate precocemente**. Per questo fin dai 3 anni sono importanti periodiche visite odontoiatriche di controllo.



Conseguenze:

- Perdita di spazio per la dentatura permanente
- Migrazione dei denti adiacenti con asimmetria delle arcate e/o spostamento della linea mediana dell'arcata corrispondente
- Eruzione ectopica (al di là della sede fisiologica) di denti permanenti
- Inclusioni (dente permanente ritenuto).

HAI UNA DOMANDA PER GLI SPECIALISTI A.S.I.O. ?
Compila il form su <http://www.asio-online.it/consulenza-ortodontista-pediatra.php>
GLI SPECIALISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE

Approfondisci le tematiche su www.agendadel sorriso.it

Cerca un ortodontista vicino a te su www.asio-online.it



Cosa fare:

- Non sottovalutare mai il problema.
- Sottoporre il bambino a controllo specialistico odontoiatrico per la prevenzione della carie.
- Mettere in atto tutto quanto possibile per evitare i traumi (es.: insegnare al bambino a cadere sul materasso proteggendosi il volto – sorveglianza attenta durante i giochi ...).
- Indicare ai genitori la necessità di una visita ortodontica precoce dallo Specialista in Ortodonzia per avere una previsione adeguata dei rischi evolutivi (eventuale applicazione di un mantenitore di spazio o fase di trattamento ortodontico precoce (Early Treatment)).
- Inviare dallo Specialista in Ortodonzia per una visita ortodontica precoce, in modo che vi sia una previsione adeguata dei rischi evolutivi (eventuale applicazione di un mantenitore di spazio o fase di trattamento ortodontico precoce (Early Treatment)).



**MANTENITORE DI SPAZIO PER LA PERDITA
PRECOCE DEL PRIMO MOLARE DECIDUO**

HAI UNA DOMANDA PER GLI SPECIALISTI A.S.I.O. ?
Compila il form su <http://www.asio-online.it/consulenza-ortodontista-pediatra.php>
GLI SPECIALISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE

Approfondisci le tematiche su www.agendadelsorriso.it

Cerca un ortodontista vicino a te su www.asio-online.it