

DIAGNOSI: i traumi dentali nella prima infanzia

Sintomi/Segni:

- Frattura della corona, lussazione o avulsione del deciduo

Cause:

- Incoordinazione motoria nella prima deambulazione, i giochi all'aperto, i maltrattamenti (sindrome del bambino picchiato), ma soprattutto le abitudini viziate come il succhiamento del pollice o di altre dita o il succhiotto, che provocano un morso aperto con avanzamento del mascellare superiore, aumento della distanza tra gli incisivi superiori ed inferiori ed incompetenza labiale



Attenzione:

- Inviare allo Specialista in Ortodonzia poiché i decidui lussati vanno stabilizzati con uno splintaggio temporaneo, mentre il deciduo avulso non si reimpianta. Nelle fratture della corona, con o senza esposizione della polpa, occorre sempre l'intervento dello Specialista, poiché si possono verificare pulpiti acute e croniche



HAI UNA DOMANDA PER GLI SPECIALISTI A.S.I.O. ?
Compila il form su <http://www.asio-online.it/consulenza-ortodontista-pediatra.php>
GLI SPECIALISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE

Approfondisci le tematiche su www.agendadelsorriso.it

Cerca un ortodontista vicino a te su www.asio-online.it

Conseguenze:

- perdita della vitalità pulpare/necrosi pulpare/ascesso/fistola
- discromia della corona
- danni sul sottostante germe del dente permanente: dislocazione, eruzione ectopica, dilacerazione radicolare, macchie/ipoplasia della corona



Cosa fare:

- informare i genitori sulla gravità delle conseguenze e sull'importanza del controllo periodico di un trauma dentale nella prima infanzia
- prevenzione e correzione delle abitudini viziate e in caso di malocclusione inviare allo Specialista in Ortodonzia per una terapia ortodontica precoce

HAI UNA DOMANDA PER GLI SPECIALISTI A.S.I.O. ?
Compila il form su <http://www.asio-online.it/consulenza-ortodontista-pediatra.php>
GLI SPECIALISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE

Approfondisci le tematiche su www.agendadelsorriso.it

Cerca un ortodontista vicino a te su www.asio-online.it