

DIAGNOSI: i traumi dentali nella seconda infanzia

Sintomi/Segni:

- Frattura della corona, lussazione o avulsione del permanente...

Cause:

- attività sportive (sport di contatto), giochi all'aperto, anomalie dentoscheletriche instauratesi con le abitudini viziate



Attenzione:

- Inviare allo Specialista in Ortodonzia poiché i permanenti lussati vanno stabilizzati con uno splintaggio ortodontico temporaneo; il permanente avulso può essere reimpiantato ma molto importante è il tempo intercorso dal momento del trauma e come è stato conservato l'elemento o il frammento di corona fratturata (latte, saliva o soluzione fisiologica). Nelle fratture della corona, con o senza esposizione della polpa, occorre sempre l'intervento dell'odontoiatra, poiché si possono verificare pulpiti acute e croniche

Conseguenze:

- Perdita della vitalità pulpare/necrosi pulpare/ascesso/fistola
- Discromia della corona

HAI UNA DOMANDA PER GLI SPECIALISTI A.S.I.O. ?
Compila il form su <http://www.asio-online.it/consulenza-ortodontista-pediatra.php>
GLI SPECIALISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE

Approfondisci le tematiche su www.agendadelsorriso.it

Cerca un ortodontista vicino a te su www.asio-online.it



Cosa fare:

- Informare i genitori sulla gravità delle conseguenze e sull'importanza del controllo periodico di un trauma dentale nella seconda infanzia
- Prevenzione e correzione delle abitudini viziate e in caso di malocclusione inviare allo Specialista in Ortodonzia per la terapia ortodontica

HAI UNA DOMANDA PER GLI SPECIALISTI A.S.I.O. ?
Compila il form su <http://www.asio-online.it/consulenza-ortodontista-pediatra.php>
GLI SPECIALISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE

Approfondisci le tematiche su www.agendadelsorriso.it

Cerca un ortodontista vicino a te su www.asio-online.it